

Specjalistyczny Szpital Miejski
im. M. Kopernika
w Toruniu

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII (preparat Fortrans)

Na 5 dni przed badaniem należy przestać przyjmować leki rozrzedzające krew: acenocumarol, warfin itp. oraz 48 godzin przed badaniem leki z grupy NOAC np.: Xarelto, Eliquis oraz Pradaxa

Na 7 dni przed badaniem należy przestać jeść:

- ziarna na pieczywie i w pieczywie, musli, mak, buraczki, kaszę, kapustę, szpinak
- owoce z pestkami (winogrono, kiwi)
- warzywa i owoce obierać ze skórki i usuwać pestki

W przeddzień badania

Rano zjeść lekkie śniadanie. Od tego momentu nie wolno przyjmować stałych pokarmów.

Od godz. 17.00 zacząć pić lek Fortrans (na receptę) wg schematu: rozpuścić 2 saszetki proszku, każdą w 1 litrze wody. Pić co 15 min. szklankę przygotowanego płynu. Można dopijać czystą wodę w dowolnej ilości.

W dniu badania

Nie wcześniej niż sześć godzin przed badaniem (oznacza to, że dla badania wykonywanego w godzinach rannych należy rozpocząć picie preparatu w nocy, od godziny 3:00) rozpuścić kolejne 2 saszetki leku Fortrans, każdą w 1 litrze wody. Pić co 15 min. szklankę przygotowanego płynu.

Ostatnia porcja preparatu powinna zostać przyjęta najpóźniej 3 godziny przed badaniem.

Jeżeli po wypiciu leku nie występują wypróżnienia żółtym, klarownym płynem należy dopijać wodę.

UWAGA: Wcześniejsze rozpoczęcie lub/i zmniejszenie ilości wypijanego preparatu lub wody znacznie zmniejszy skuteczność przygotowania, a tym samym wpłynie negatywnie na jakość badania.

Leki przyjmowane na stałe należy zażywać.